



Cinquantamila interventi l'anno, ma non è più tempo di maggiorate. Si preferiscono operazioni in day hospital con lipofilling e macrofiller. Specialisti a convegno questa settimana, mentre cresce l'allarme sui filler per il viso

# Chirurgia estetica

## Un seno nuovo? Ora è fast e soft Ma per le under 18 arriva la legge

CLAUDIA BORTOLATO

**P**

ieno, alto e sodo. Il seno ideale dovrebbe rispondere a questi canoni, almeno secondo le 50mila donne italiane che nel 2008 hanno richiesto un intervento di mastoplastica. Numeri che, secondo la Sicpre (Società italiana chirurgia plastica ricostruttiva estetica), includono una percentuale di ragazze under 18. Un preoccupante fenomeno, quello del "baby-ritocco", al quale è stato posto un freno con il disegno di legge varato venerdì scorso, per il successivo passaggio alle Camere, che prevede il divieto di impianto di protesi mammarie a fini estetici per le minorenni, oltre ad obblighi informativi alle pazienti e all'istituzione del registro nazionale e dei registri regionali delle protesi (il primo in Europa) che consentirà, attraverso un codice, la piena tracciabilità del materiale usato dal chirurgo, e di risalire ad altre importanti informazioni relative all'intervento.

Novità che arrivano sull'onda di un generale "ravvedimento" rispetto a certe esagerazioni del recente passato. «Oggi si ambisce a un effetto naturale, molto lontano dall'icona della maggiorata. Per questo la scelta delle protesi — anatomiche o rotonde — dipende dalle caratteristiche

specifiche del seno della paziente: da misura, forma, qualità della pelle e altre variabili», premette il chirurgo estetico Giuseppe Sito, docente della Scuola superiore post universitaria di medicina di indirizzo estetico Agorà di Milano. «Anche il tipo di incisione (ascellare, intorno all'areola o sotto il solco mammario) va valutata ad personam, in base alle esigenze estetiche e al posizionamento delle protesi, oltre che alle preferenze della donna», precisa Sito.

Accanto alla mastoplastica additiva con protesi al gel coesivo di silicone (che rimane l'indicazione elettiva per aumentare il seno di una o più taglie e per mantenere il risultato nel tempo), che è un intervento chirurgico importante, eseguito in anestesia locale con sedazione profonda o in anestesia generale e con un decorso post-operatorio relativamente impegnativo, sono in aumento gli interventi di rimodellamento del seno con lipofilling (prelievo di grasso autologo con una micro-liposuzione che, opportunamente trattato, viene iniettato attraverso una piccola cannula a punta smussa) e soprattutto con i macrofiller a base di acido ialuronico, specifici per il body-shaping, dei quali si parlerà ampiamente anche durante il Congresso internazionale della Sies, Società italiana di medicina e chirurgia estetica, a Bologna dal 26 al 28 febbraio. «Questa metodica si utilizza per

migliorare la forma e il volume del seno, ma solo nell'ordine di una taglia-una taglia e mezzo. È

un intervento più soft rispetto all'inserimento di protesi, ma il materiale iniettato è riassorbibile: l'effetto dura dai 12 ai 18 mesi, poi va ritoccato», precisa Sito.

E a proposito di filler utilizzati per "riempire" le rughe o modellare labbra e altre zone del viso: secondo un'indagine condotta su 1500 donne dal Centro interuniversitario di dermatologia biologica e psicosomatica di Firenze, in un caso su quattro si verificano effetti collaterali. «La più alta incidenza, 10 per cento dei casi, riguarda i granulomi, a seguire le infezioni batteriche (7) e le recidive di un'infezione da herpes simplex (5)», spiega Torello Lotti, ordinario di dermatologia all'Università di Firenze e presidente SideMast, Società italiana dermatologia medica, chirurgica, estetica. «Effetti avversi che possono imputarsi alla reazione individuale ma anche dalla scarsa qualità e sicurezza di alcuni filler: basti pensare che degli oltre 170 prodotti con il marchio CE presenti sul mercato in Italia, appena sette hanno ricevuto l'approvazione della Food and Drug Administration americana», sottolinea Lotti. Per questo, e anche in dipendenza della diffusione esponenziale del ricorso alle "punturine" (ogni anno le scelgono oltre un milione e mezzo di donne fra i 30 e i 45 anni e circa 500mila uomini), la Side-

Mastha proposto di equiparare i fillers ai farmaci iniettabili e di creare un registro che certifichi gli specialisti accreditati, in collaborazione con l'Ordine dei Medici di Roma e in accordo con le maggiori società scientifiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## RADIOGRAFIA DEI TRATTAMENTI ESTETICI

IN ITALIA

**6mila**


adolescenti sotto 18 anni hanno fatto richiesta di iniezioni di botox, collagene, peeling chimici e dermoabrasioni

IN EUROPA, almeno

**60mila**

### È favorevole alla chirurgia?

Base: popolazione per fascia di età, in %



### Che cosa pensa della chirurgia plastica? Dati: Italia, 2007

LAVORATORI

PENSIONATI

Le persone che ricorrono alla chirurgia non stanno bene con se stesse

**85%**

Quasi alla  
chirurgia si può  
arrivare più  
facilmente

**36%**

Le persone che ricorrono alla chirurgia non stanno bene con se stesse


**71%**

Quasi alla  
chirurgia posso  
arrivare

**23%**

### Ricorrerebbe alla chirurgia plastica a scopo di...

**■** cambiare qualcosa di sé che non le piace? **■** sembrare più giovane?



FONTE: AXA, RICERCA SULLA PENSIONE 2007/ EURISPES 2006


## I LIBRI



**TUTTA DA RIFARE**  
Giorgia Würth  
Pagine 169  
16 euro  
**Fazi editore**



**APPENA HO 18 ANNI MI RIFACCIO**  
Cristina Sivieri  
Tagliabue  
Pagine 240  
16 euro  
**Bompiani**



**RIFARSI IL SENO**



L'impianto di protesi mammarie è l'intervento di chirurgia estetica più richiesto nel mondo

**50mila**

mastoplastiche additive eseguite in Italia (2008)

**LE INIEZIONI**

Senza protesi, l'aumento è di una taglia



**LIPOFILLING**

È un impianto di grasso autologo, prelevato da micro-liposuzione

- In day Hospital
- Anestesia locale
- Durata: lunga

**BODY SHAPING CON ACIDO IALURONICO**

Tra il muscolo e la ghiandola si inietta il filler: acido ialuronico, un materiale riassorbibile

- In ambulatorio chirurgico
- Anestesia locale
- Durata: a 12 a 18 mesi

I filler vengono iniettati con una piccola cannula nel solco mammario o nel cavo ascellare

Ghiandola

Filler

Muscolo

**LE PROTESI**

**ANATOMICHE**

Effetto naturale


**ROTONDE**

Misura media

Misura grande



**RETROGHIANDOLARE**




Protesi

Ghiandole lattifere

Tessuto adiposo

**RETROMUSCOLARE**




Muscolo gran pettorale

Muscolo piccolo pettorale

Protesi

**TIPO DI INCISIONI**

**TRANS-OMBELICALE**  
(poco utilizzata in Italia)



Si inserisce la protesi sgonfia e si riempie con soluzione salina quando è già posizionata

**TRANS-ASCELLARE**



La protesi si inserisce nell'incavo delle ascelle, dove si crea un tunnel verso il seno

**PERI-AREOLARE**



Si fa una incisione lungo il perimetro dell'areola e si accede al tessuto sotto il seno

INFOGRAFICA PAULA SIMONETTI

www.ecostampa.it

036286